

RELATORI

- Dr. Tiziana Arcangeli psichiatra - CSM Guidonia
Dr. Romano Baccani farmacologo - UOSD Cure Primarie
Dr. Emanuele Barbarino psichiatra - CSM Guidonia
Dr. Giorgio Fedeli cardiologo - Distretto RMG2
Dr. Roberto Gramiccia direttore - Distretto RMG2
Dr. Ilaria Martino psichiatra - CSM Guidonia
Dr. Aldo Pantò psicologo - CSM Guidonia
Dr. Daniela Pappa psicologa - CSM Guidonia
Dr. Rinaldo Perini direttore Dipartimento Salute Mentale
Dr. Massimo Persia tossicologo - responsabile Ser.T. Tivoli-Guidonia
Dr. Rosalba Spadafora psichiatra - responsabile CSM Guidonia
Dr. Carlo Spatocco psicologo - responsabile Centro Diurno Guidonia
Dr. Massimo Stramacci cardiologo - responsabile UOSD Cure Primarie



Cocaina, Cuore, Psiche

*“...quando nevicava nel tuo naso, prendi freddo al cervello”
(A.Ginsberg) ... ma anche al cuore...*

Sabato 7 MAGGIO 2011

**GUIDONIA - Via Fratelli Gualandi, 35
Aula Magna**

ECM per medici, psicologi, infermieri: 4 crediti.

Per iscrizioni inviare e-mail alla segreteria organizzativa con i propri dati.

Si ringraziano



**Dipartimento di Salute Mentale ASL RMG - CSM di Guidonia
Distretto RMG 2 - ASL RMG - UOSD Cure Primarie**

PROGRAMMA

da: 9.00 a: 9.20	Saluto del Direttore Distretto RMG2 e del Direttore Dipartimento Salute Mentale	R. Gramiccia R. Perini
da: 9.20 a: 10.00	Cocaina: non tutti sanno che...	R. Baccani
da: 10.00 a: 10.20	Psicopatologia dei cocainismi	T. Arcangeli
da: 10.20 a: 10.40	Disturbi psichiatrici indotti da cocaina	E. Barbarino
	PAUSA	
da: 11.10 a: 11.30	Disturbi cardiaci indotti dalla cocaina e trattamento	G. Fedeli
da: 11.30 a: 11.50	Doppia diagnosi psichiatrica e trattamento	R. Spadafora
da: 11.50 a: 12.10	Complicanze dismetaboliche dell' abuso di cocaina e trattamento	M. Stramacci
da: 12.10 a: 12.30	Disturbo di personalità nell'abuso di cocaina	A. Pantò
da: 12.30 a: 12.50	Interventi psicoterapeutici nell'abuso di cocaina	C. Spatocco
	PAUSA	
da: 14.00 a: 14.20	Strumenti di valutazione psicodiagnostica	D. Pappa
da: 14.20 a: 14.40	Aspetti medico legali dell'intossicazione	I. Martino
da: 14.40 a: 15.30	Discussione con i relatori	M. Persia
da: 15.30 a: 16.00	Verifica dell'apprendimento	

Secondo uno studio pubblicato nel 2011, e relativo al 2009, dalla ASL Milano 1, il consumo di cocaina, anche episodico o isolato, durante l'anno ha riguardato il 4,9% dei maschi ed il 2,2% delle femmine dei soggetti tra i 15 e i 19 anni. La diffusione dell'uso della cocaina, come evidenziato dagli studi, a carattere nazionale, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IPSAD (r) 2007-2008), risulta particolarmente elevata.

Negli anni 2002-2003, il 12% circa della popolazione tra i 15 e i 34 anni di età, riferiva abuso di cocaina nell'anno trascorso. Sul piano psicopatologico a breve termine dall'assunzione (fino ad un'ora), la cocaina produce euforia e attivazione, ma anche irritabilità, ansia, paranoia, irrequietezza, con effetti più rapidi ma meno duraturi per il crack fumato; a medio-lungo termine, la cocaina peggiora il decorso dei disturbi affettivi, psicotici e d'ansia, inasprisce i comportamenti connessi ai disturbi di personalità, attiva disturbi psicopatologici, di varia gravità e tipo, che possono recedere dopo anche mesi dalla disintossicazione, o permanere, come se la sostanza avesse avuto effetto scatenante.

L'apparato cardiocircolatorio, poi, è senz'altro uno dei bersagli delle conseguenze dell'uso di cocaina, motivo di alterazioni funzionali ed organiche.

L'alta incidenza del fenomeno nei diversi strati sociali e fasce di età, induce gli esperti ad allertare i medici di base, e le altre figure sanitarie, affinché, di fronte ad eventi patologici di natura cardiologica di incerta interpretazione, sia posta tra le ipotesi diagnostiche, anche quella di abuso di cocaina.

Si è voluta unificare la competenza clinica-tossicologica e cardiologica dei relatori per rafforzare questa convinzione, suffragata da rilievi statistici nazionali e internazionali.

A lungo termine, l'abusatore di cocaina sviluppa vera e propria dipendenza, e craving. Può svilupparsi da un lato tolleranza agli effetti psichici, e da un altro lato sensibilizzazione agli effetti convulsivanti, ansiogeni, e in generale tossici, e cardiovascolari in particolare. Tra gli effetti a lungo termine, un aumento del rischio di contrarre l'infezione da HIV e da HCV, dovuta alla maggiore probabilità di comportamenti a rischio.

Un particolare rischio è quello del feto di madri abusatrici in gravidanza: parto prematuro, minor peso e lunghezza alla nascita, e probabilmente, a lungo termine, dopo la nascita, subdoli deficit cognitivi, dell'attenzione, della capacità di elaborazione dati.

Al momento, non vi è alcuna terapia farmacologica per l'abuso/dipendenza da cocaina, approvata ufficialmente. Tuttavia, l'interesse per l'individuazione di una terapia biologica è intuitivamente molto alto, date le dimensioni quantitative del problema.

La terapia psicologica include vari programmi, ambulatoriali e comunitari.

Responsabili Scientifici

Dr. Romano Baccani - Distretto RMG2 - UOSD Cure Primarie - ASL RMG
Dr. Rosalba Spadafora - DSM - Centro Salute Mentale Guidonia - ASL RMG
Dr. Massimo Stramacci - Distretto RMG2 - UOSD Cure Primarie - ASL RMG

Segreteria Organizzativa

Dr. Luisa Cesario psicologa tirocinante - Centro Salute Mentale Guidonia - ASL RMG
Dr. Maria Marrella psicologa volontaria - Centro Salute Mentale Guidonia - ASL RMG
guidoniaeventi@gmail.com